HANDLÄGGNING STI PÅ AKUTMOTTAGNING

Män som söker för miktionssveda, flytning, smärtor i pungen eller misstänkt epididymit:

- STI-prover från urin: Gonorré, klamydia och mycoplasma genitalium.
- Unga män utan kända urinvägsanomalier har vanligtvis inte UVI. Urinsticka visar ofta positivt på leukocyter och/eller erytrocyter vid STI-er. Vid stark misstanke på UVI bör urinodling tas.

Kvinnor som söker för miktionssveda, flytning, smärtor i nedre delen av buken m/u feber:

- STI prover vaginalt: Klamydia, gonorré och mycoplasma genitalium. (Självprov kan erbjudas)
- Urinsticka visar ofta positiv för leukocyter och/eller erytrocyter och STI kan inte uteslutas. Vid positiv nitur talar detta för UVI men STI prover bör ändå alltid tas med tanke på samtidig STI.
- Observera att påbörjad antibiotikabehandling försvårar STI-provtagning i senare skede vid missad diagnos i första skedet. Kan leda till fördröjd diagnos och ökar risken för komplikationer och fortsatt smittspridning.

Genitala sår:

- Prov taget med bomullspinne för herpesvirus 1 och 2 (HSV 1 och 2) med PCR-analys .
- Om stark misstanke på syfilis-sår* bör patienten remitteras till STI-mottagning. Serologi för syfilis bör tas på akutmottagning.

*Ofta ej ömmande solitärt sår anogenitalt eller oralt hos MSM och TS eller personer som haft oskyddad sex utanför Norden och/eller och vid prostitutionskontakt.

Sexualanamnes är viktig, så att inte relevant provtagning missas, såsom prov från svalg och rektum.
Erbjud generöst HIV-test!

Vid positivt prov för STI som lyder under Smittskyddslagen
Okomplicerad genital klamydia handläggs av läkare på akuten:

- Recept skrives på Doxyferm 100 mg 1x2 i 7 dagar, fritt enligt smittskyddslagen.
- Patienten informeras av läkare om diagnos, behandling och att patient bör undvika samlag tills hen är färdigbehandlad, enligt SmL.
- SmiNet-anmälan (kanske en länk här?)
- Remiss skrives till STI-mottagning för smittspårning

Gonorré och syfilis plus rektal klamydia hos MSM och TS ska remitteras till STI-mottagning för kompletterande provtagning, behandling och smittspårning. Undvika att behandla med antibiotika pga resistens hos gonokocker som kräver provtagning med odling innan antibiotika sätts in.
Vid positivt HIV prov kontaktas infektionskliniken.

Smittskyddslagen:

3 kap. 1 § SmL

Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.

En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs

Förkortningar:

STI = Sexuellt överförda infektioner (Sexual transmitted infection)
UVI = Urinvägsinfektion
MSM = Män som har sex med män
TS = Transsexuella personer
STI-mottagning står för specialistmottagning för STI och venereologi
SmL = Smittskyddslagen
HSV = Herpes simplex virus
HIV = Humant imunbrist virus

September 2023
Annika Johnsson
Karin Sanner
Miryam Spångerud
Rebecka Vyth