



Karolinska
Institutet



Xanthelasma

Sam Polesie

överläkare, docent, adjungerad universitetslektor, kursledare i dermatologi

Avdelningen för dermatologi och venerologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Verksamhet hud- och könssjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra götalandsregionen, Göteborg

sam.polesie@vgregion.se | sam.polesie@gu.se

Längd: 3 min 12 sekunder

Senast uppdaterat: 2025-12-23

















Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Sammanfattning

Definition: Upphöjda, mjuka gula plack över ögonlock.

Vanligaste formen av kutant xanthom

Vanligaste lokalen är det övre ögonlocket och den mediala delen.

Förekommer hos cirka 0.3% av män och 1.1% av kvinnor

Vanligaste i åldern 30-50 år

Tänk på bakomliggande komorbiditet och då i huvudsak hyperlipidemi.

Orsakar ingen funktionella besvär men kan vara kosmetiskt störande

Differentialdiagnoser

Ofra helt typisk klinisk bild

Behandling

För patienter med höga lipidnivåer har lipidsänkande läkemedel / omställning av dieten en begränsad effekt avseende xanthelasma.

Det finns flera behandlingar som finns listade inklusive kirurgisk excision samt laserbehandling.

Ingen behandling erbjuds däremot i offentligt finansierad sjukvård



Karolinska
Institutet

