GÖTEBORGS UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ANNO 1810

Karolinska Institutet

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LUNDS UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET

UPPSALA UNIVERSITET

ÖREBRO UNIVERSITET



Hudinfektioner orsakade av Humant papillomvirus (HPV)

Torborg Hoppe

Överläkare/Adjungerad universitetslektor

Hudkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet

Torborg.hoppe@medsci.uu.se

Humant papillomvirus (HPV)

- Verucca vulgaris
- Kondylom

Humant papillomvirus (HPV)

- Fler än 200 subtyper HPV (humant papillomvirus)
- Olika kliniska varianter t.ex. fotvårtor, plana vårtor, kondylom
- Smitta via direkt hudkontakt, indirekt kontakt eller autoinokulation (tex kliande, rakning)
- Vanliga vårtor mest hos barn, minskad prevalens i tonåren. Självläker ofta inom två år, spridningen är dock stor





Verrucca vulgaris





Verrucca plantaris





© Richard Usatine, M.D.
Dermatlas.net

Verrucca plana



Filiform verrucca

Behandling av vårtor

- Salicylsyra, ev under ocklusion
- Fotvård (bad, filning)
- Vårtmedel med myrsyra eller triklorättikssyra
- Frysbehandling

- Självläker i regel inom ca 2 år





Karolinska Institutet



LINKÖPINGS UNIVERSITET



LUNDS UNIVERSITET





UPPSALA UNIVERSITET



ÖREBRO UNIVERSITET