



Karolinska
Institutet



Huvud-, kläd- och flatlöss

Simon Gerhardsson

Legitimerad läkare

Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus Lund

simon.gerhardsson@skane.se

Senast uppdaterad: 2026-02-02

Inledning

- Lusinfestation = pediculos
- Blodsugande ectoparasiter

- Tre arter:
 - Huvudlus
 - Klädlus
 - Flatlus



- Vägglöss ≠ löss!

Inledning forts.

- Klåda vanligaste symtomet
- Fördröjd immunologisk reaktion (typ IV)
- Löss och gnetter
- Ibland exkorationer och sekundärinfektion

Huvudlöss - pediculosis capitis

- Barn i förskole- och skolålder
- Prevalens 19% globalt i denna grupp
- Hårbotten
- Spridning: direktkontakt



Hårlöss - pediculosis capitis

- Diagnos: **levande** lus
- Luskam

- Behandling med dimetikonbaserade lusmedel
- Kamning



Klädlöss - pediculosis corporis

- Lever i kläder och sänglinne
- Kommer till huden för blodmål
- Historiskt: vektor för fläcktyfus
- Markör för social utsatthet
- Idag **mycket** ovanlig

Flatlöss - pediculosis pubis

- Spridning: direkt kroppskontakt
- Ofta sexuell överföring
- Pubis vanligast
- Kan även drabba:
 - Axiller
 - Skägg
 - Ögonfransar
- Ofta flera lokaler samtidigt



Flatlöss - pediculosis pubis

- Överväg provtagning för annan STI
- Lokala disulfirampreparat (Tenutex®)
- Tvätt av kläder och sänglinne

Sammanfattning

- Hårlöss: Vanligt, ofarligt
- Klädlöss: Markör för social utsatthet
- Flatlöss: Sexuell smitta - tänk bredare



**Karolinska
Institutet**



**LUNDS
UNIVERSITET**

