

Gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård

Innehållsansvar: Frida Appelqvist, (friap), Sektionschef

Godkänd av: Anette Gente Lidholm, (anest7), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-02-07

Giltig till: 2026-02-07

Operation – Antibiotikaprofylax vid hudkirurgi

Förändringar sedan föregående version

Revidering gällande endokarditprofylax.

Bakgrund och syfte

Korrekt handläggning av antibiotikaprofylax i samband med hudkirurgisk operation.

Utförande

Följande patienter kan behöva antibiotikaprofylax i samband med hudkirurgi:

- Patient med inflammation eller infektion i hudområdet som ska opereras.
- Patient med tumörer belägna nära kroppsöppningar (t.ex. näsborre eller mun).
- Patient med tumörer belägna i varmt och fuktigt område (genitalt, ljumskar).
- Patient som har svårt att sköta sin hygien.
- Patient som tidigare fått infektion i samband med operation.
- Organtransplanterad patient, särskilt de som tidigare fått infektion i samband med operation.

Val av antibiotika

I första hand: Flukloxacillin 1 g 1x3 i 7 dgr.

I andra hand: Cefadroxil 500 mg 1x2 i 7 dgr.

Vid PC-allergi: Dalacin 300 mg 1x2 i 7 dgr.

Endokarditprofylax

Endokarditprofylax med antibiotika vid ingrepp med risk för bakteriemi rekommenderas inte längre rutinmässigt, inte ens när inopererad klaffprotes föreligger.

Granskning av evidensen för detta visar att nackdelarna sannolikt överväger ev. fördelar.

I individuella fall kan profylax ges till patienter med **både** hög risk för endokardit (t.ex. klaffprotes, tidigare endokardit eller medfött hjärtfel med cyanos) **och** i behov av kirurgi i infekterad hud eller mun.

Amimox® 2 g, 1 timme före operation (50 mg/kg om vikt <40 kg).

Vid PC-allergi: Dalacin® 600 mg, 1 timme före operation (15 mg/kg om vikt <40 kg).

Obs! Anpassad dosering kan krävas hos vissa patienter (t.ex. vid njursvikt).

Ansvar

Opererande läkare vid enheten ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Rutinen meddelas personal på APT och vid introduktion av nyanställd.

Uppföljning, utvärdering och revision

För uppföljning/revision svarar den ansvarige för tumörprocessen. Avsteg från rutinen dokumenteras i patientens journal. Upptäckta avvikelser rapporteras i MedControl Pro.

Granskare/arbetsgrupp

Hannah Ceder, specialistläkare VO Hud- och könssjukvård (hance)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård

Innehållsansvar: Frida Appelqvist, (friap), Sektionschef

Godkänd av: Anette Gente Lidholm, (anest7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9783-1307954543-43

Version: 8.0

Giltig från: 2024-02-07

Giltig till: 2026-02-07