Gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
Innehållsansvar: Frida Appelqvist, (friap), Sektionschef
Godkänd av: Anette Gente Lidholm, (anest7), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-04-23
Giltig till: 2026-04-22

Operation - Antikoagulantia

Förändringar sedan föregående version

Stycke om seponeringar vid undantagsfall borttaget då ej aktuellt längre.

Bakgrund och syfte

Korrekt handläggning av antikoagulantia i samband med operation.

Utförande

Vi rekommenderar **inte** utsättning av NSAID, acetylsalicylsyra (Trombyl®), warfarin (Waran®), clopidogrel (Plavix®), trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa®) eller faktor Xa-hämmarna edoxaban (Lixiana®), rivaroxaban (Xarelto®) och apixaban (Eliquis®) i samband med enkel hudkirurgi. Vid all hudkirurgi är noggrann hemostas viktig och därför bör bipolär diatermi (CoaComp®/M) användas rutinmässigt vid alla ingrepp. Det föreligger mycket liten risk för blödningskomplikationer om patienten står kvar på NSAID[1-3], acetylsalicylsyra[1-9], warfarin[1-5, 7-10], clopidogrel[9] eller nya antikoagulantia[11] i samband med enkel hudkirurgi. Det finns tvärtom en ökad risk för tromboemboliska komplikationer om antikoagulantia sätts ut.[1-10]

Ansvar

Samtliga läkare vid verksamheten som utför operationer. Rutinen meddelas personal på APT och vid introduktion av nyanställd.

Uppföljning, utvärdering och revision

Tumöransvarig läkare ansvarar för uppföljning/revision. Avsteg från rutinen dokumenteras i patientens journal. Upptäckta avvikelser rapporteras i MedControl Pro.

Referenser

1. Billingsley EM, Maloney ME. Intraoperative and postoperative bleeding problems in patients taking warfarin, aspirin, and nonsteroidal antiinflammatory agents. A prospective study. Dermatol Surg 1997;23:381-3, pdf länk

2. Otley CC, Fewkes JL, Frank W, Olbricht SM. Complications of cutaneous surgery in patients who are taking warfarin, aspirin, or nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Arch Dermatol 1996;132:161-6, html länk

3. Stables G, Lawrence CM. Management of patients taking anticoagulant, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory and other anti-platelet drugs undergoing dermatological surgery. Clin Exp Dermatol 2002;27:432-5, html länk

4. Alam M, Goldberg LH. Serious adverse vascular events associated with perioperative interruption of antiplatelet and anticoagulant therapy. Dermatol Surg 2002;28:992-8; discussion 8, html länk

5. Alcalay J, Alkalay R. Controversies in perioperative management of blood thinners in dermatologic surgery: continue or discontinue? Dermatol Surg 2004;30:1091-4.

6. Bartlett GR. Does aspirin affect the outcome of minor cutaneous surgery? Br J Plast Surg 1999;52:214-6, html länk

7. Kovich O, Otley CC. Thrombotic complications related to discontinuation of warfarin and aspirin therapy perioperatively for cutaneous operation. J Am Acad Dermatol 2003;48:233-7, html länk

8. Schanbacher CF, Bennett RG. Postoperative stroke after stopping warfarin for cutaneous surgery. Dermatol Surg 2000;26:785-9, html länk

9. Palamaras I, Semkova K. Perioperative management of and recommendations for antithrombotic medications in dermatological surgery. Br J Dermatol 2015;172(3):597-605.

10. Alcalay J. Cutaneous surgery in patients receiving warfarin therapy. Dermatol Surg 2001;27:756-8, html länk

Granskare/arbetsgrupp

Julia Fougelberg, specialistläkare, sektionschef (julfo1)
Hannah Ceder, specialistläkare (hance3)

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård

Innehållsansvar: Frida Appelqvist, (friap), Sektionschef

Godkänd av: Anette Gente Lidholm, (anest7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9783-1307954543-44

Version: 11.0

Giltig från: 2024-04-23

Giltig till: 2026-04-22